



XXXIX
Congreso
de la semFYC

DEL 9 AL 11 DE MAYO
DE 2019
MÁLAGA

Con la familia y su comunidad



Hospital Lleuger
Antoni de Gimbernat
CAMBRILS

ID: 1523

Autores: Gómez Fernández, E*; Vasco Rodríguez, Y**; Asensio Vidal, M***; García Acosta, Georky *

*MIR, **DUI, ***MFYC

COMPARATIVA DE COMPLICACIONES CLÍNICAS EN PACIENTES OCTOGENARIOS TRATADOS CON DICUMARÍNICOS VERSUS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES

OBJETIVOS


Comparar entre pacientes mayores de 85 años diagnosticados de fibrilación auricular (FA) tratados con dicumarínicos o Nuevos Anticoagulantes Orales (NACO), el número de visitas ambulatorias, a urgencias e ingresos hospitalarios y caídas.

MATERIAL Y MÉTODOS


- Estudio descriptivo retrospectivo. Población estudio, pacientes con diagnóstico de FA mayores de 85 años. N=67. Se realizó revisión HC durante el año 2018. Se recogieron las variables: edad, sexo, tipo ACO, ingresos, visitas y caídas.
- Se realiza análisis descriptivo de las variables cuantitativas y promedio en las categóricas. Aplicamos la t-Student para muestras independientes en la comparación de medias. Se utiliza el paquete estadístico SPSS v24.

RESULTADOS


\bar{X} Edad **88,78**
DE: 2,65
Mujeres **55,2%**



\bar{X} Visitas CAP
Sintrom **14,08**
DE: 4,62




\bar{X} Visitas Urgencias
NACOS **0,82**
DE: 1,68




No existen diferencias estadísticamente significativas según el ACO respecto al nº de visitas e ingresos.

ETIQUETA SEGÚN TIPO ANTICOAGULANTE



Nº DE CAIDAS SEGÚN TIPO ANTICOAGULANTE



Los tratados con **NACO** presentan una media de **caídas 0,07** DE: 0,25; lo que representa el **6,7%** de este grupo.

CONCLUSIÓN

Existe mayor incidencia de complicaciones y co-morbilidad en pacientes que usan anticoagulantes convencionales frente a los pacientes tratados con los nuevos anticoagulantes.

